

## Autoritatea Nationala Fitosanitara Oficiul Fitosanitar Ilfov

Comuna Stefanestii de Jos,  
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739  
e- mail: [fitosanitar.ilfov@gmail.com](mailto:fitosanitar.ilfov@gmail.com)

### BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 60 din 14.06. 2023

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **PLASMOPARA VITICOLA (Mană); UNCINULA N. ( Fainarea ).**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la: **VITA DE VIE**



Scurtă descriere a bolii :

**Plasmopara v. ( mană),boala se manifestă pe toate organele supraterane ale plantei.** Atacul pe frunze e cel mai frecvent, pe fata superioară a frunzelor, apar pete galbui. Acestea au aspectul de pete undelemnii, petele undelemnii confluiază și ocupă portiuni mari pe limbul frunzei. Treptat, petele foliare se măresc, capătă culoarea roșiatică, iar în dreptul tesuturilor se necrozează, se brunifică și se usuca. În timpul înfloritului în anii ploiosi, atacul este foarte periculos pe ciorchinii tineri, deoarece acestia se usuca și cad. Boala se poate manifesta și pe boabe în toate stadiile de dezvoltare. Atacul se poate manifesta prin putregaiul cenusiu și putregai brun. Fructele infectate sunt acoperite cu puf alb – cenusiu. Putregaiul brun apare pe boabele mai mari, infectia se realizează prin reduncul și receptacul. Boabele atacate devin brune, se zbarcesc și cad.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr. 3:**

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz cu:

1. MAGMA TRIPLE/ ALLEATO TRIPLE - 0,2 - 0,3 % sau
2. CHAMP 77 WG / COPPERMAX – 0,2% sau
3. CURENOX 50 – 0,15 -0,2 % sau
4. CAPTAN 80 WDG /CAIMAN – 1,250 kg./ha sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu insecticide pentru combaterea daunatorilor:

**LOBESIA BOTRANA (Molia strugurilor);  
ERIOPHYES SP. (ACARIENI EROFIZI)  
TETRANYCHUS SP. ( Paianjanul rosu comun)**



### **LOBESIA B. (Molia strugurilor).**

*Molia vitei de vie are 2 – 3 generatii pe an. Fluturele are anvergura aripilor de 1,8 – 2 cm, corpul de 0,8 cm lungime. Aripile posterioare sunt cenusii cu franjuri, iar cele anterioare prezinta pete de culoare bruna alternand cu zonele deschise de culoare cenusie – albastruie. Larva are corpul colorat brun – verzui, verde- deschis, lungimea corpului este de 1,2 cm. In lunile iunie – iulie femela generatiei a II – a isi depune pontele pe boabele verzi sau in parga ale strugurilor. Semnele atacului sunt evidente prin prezenta larvelor pe ciorchine, sub scoarta butucilor, coardelor mai batrane ce se exfoliază. In luna iunie apar larvele generatiei a I – a care se hrănesc cu bobocii floriferi si boabe tinere. Atacul generatiilor a II – a (luna iunie) si a III – a (luna august) atunci gauresc boabele si consuma pulpa dand posibilitatea instalarii cu usurinta a putregaiului (BOTRYTIS CINEREA).*



### **ERIOPHYES SP.( ACARIENI EROFIZI), prezinta 5 -7**

*Ierneaza in stadiul de adult sub solzii exteriori ai mugurilor,in crapaturile scoartei butucilor. In primavara, acarienii isi fac aparitia la inceputul lunii mai, in faza cand incep sa se formeze primele frunzelite, localizandu-se pe partea inferioara a limbului, unde se hrănesc intepand tesuturile si sugand sucul celular. La locul hrăririi apare o pasla de peri epidermici ,la adăpostul careia acarienii se hrănesc si se inmultesc. Cand tesuturile din zonele daunate se necrozeaza, acarienii migreaza pe alte frunze neatacate. In cazul unui atac puternic sunt atacati si ciorchinii, cand acestia se afla in faza de inflorire, producand avortarea florilor.*



### **TETRANYCHUS SP.(Paianjanul rosu comun),ataca**

*aparatul foliar,pe partea inferioara a frunzelor. Pe frunze se recunoaste cu usurinta dupa prezenta unei pasle matasoase maronii, iar pe partea superioara a frunzelor dupa depigmentarea,albirea si uscarea dintre nervuri. Atat adultii cat si larvele se hrănesc cu seva plantelor,pe care o absorb din tesuturi prin intepare.*

- 1. DELTAGRI / FASTER DELTA - 0,2 - 0,3 l/ha sau**
- 2. VERTIMEC 1,8% EC - 0,075 - 0,1% sau**
- 3. CYPERGUARD 25 EC /FOSTOC - 0,2 l/ha sau**
- 4. NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha sau**
- 5. LASER 250 SC / NEXUBA – 0,15- 0,2 l/ha sau**

**alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.**

**Perioada optimă de tratament:**LA COMPACTAREA CIORCHINIILOR****

**Alte recomandari:**

Tratamentul se va efectua in perioada avertizata in zile fara vant, si se va repeta la 10- 14 zile in functie de remanenta produsului folosit si conditiile meteo.

Verificati,cu mare atentie,recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor,normele de protectie si securitate a muncii,de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS ( privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare  
Maria BOGDAN