



AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ



OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Județul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e-mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.86 din 10.11.2020

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția daunatorului/bolii:
BACTERII SI CIUPERCI FITOPATOGENE (focul bacterian al rozaceelor, rapan, fainare, monilioze, patate rosie, ciuruire)

care poate cauza pierderi importante la cultura: **POMI SI ARBUSTI FRUCTIFERI.**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian)** Pe perioada de iarna,bacteriile rezista bine in zonele marginale ale ulcerelor formate in sezonul anterior pe ramuri si trunchi,indeosebi la par,mai putin la mar.De asemenea bacteriile supravietuiesc in muguri,fructe bolnave si ramuri.Primavara,bacteriile devin active,se inmultesc,atacul se manifesta pe toate organele supraterane ale plantei. Arsura inflorescentelor este primul simptom si apare primavara devreme.Florile se ofilesca, se brunifica si se inegresca.Ele cad sau raman atasate de pom.Pe frunze, atacul se manifesta sub forma unor pete brune, care se extind si ocupa intregul limb foliar. Lastarii atacati au frunze moarte si persistente. Fructele bolnave se inegresca la par si se brunifica la mar.

VENTURIA INAEQUALIS (Rapanul) Toamna la caderea totala a frunzelor trebuie aplicate masuri de igiena culturala ,de curatire si indepartare a ramurilor bolnave,de curatirea muschilor,lichenilor de pe suprafata trunchiurilor si a ramurilor. Primavara ciuperca ataca toate organele tinere ale plantei (frunze, flori,ramuri ,fructe).Atacul pe frunze se manifesta prin pete mici,cenusii, care se extind treptat. Mai tarziu ,petele foliare prezinta o culoare bruna- maslinie.Atacul pe flori este asemanator cu cel descris pe frunze.Pe fructe apar pete cenusii- maslinii,in dreptul carora tesuturile se suberifica si crapa.

PODOSPERA LEUCOTRICHIA (Fainarea) Ciuperca ierneaza sub forma de miceliu de rezistenta in mugurii vegetativi si florali. Primavara atacul se manifesta pe frunze, flori, lastari tineri.Frunzele tinere atacate sunt deformate, casante si se rasucesc cu marginile in sus. Frunzele afectate se usuca de timpuriu. Florile de mar atacate au sepalele deformate,ele raman sterile. Atacul pe fructele tinere produce o stagnare in crestere sau chiar caderea acestora.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului , numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz

ALCUPRAL 50 PU - 0,2-0,3 % sau

FUNGURAN OH 50 WP - 0,3 % sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Alte recomandări;

Tratamentul se aplica in perioada de repaus vegetativ a pomilor, dupa caderea totala a frunzelor.

Frunzele cazute se vor stranga inainte de efectuarea tratamentului. Pentru combatere se recomanda in perioada de repaus vegetativ (in fereastrile iernii, cu temperaturi pozitive si lipsite de precipitatii) un tratament cu **FUNGURAN OH 50 WP in concentratie de 3,0%**

Tratamentul se va efectua in zilele fara vant, chiciura, ploaie sau ceata cand temperatura aerului depaseste 6 °C.

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor recomandate in PEST EXPERT pentru teste avertizante; Cititi cu atentie prospectul produselor de protectia plantelor inainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protectia mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu stricte normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protectia familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii si nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protectia plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vor inscripționa cu tablile de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor" (denumirea produsului folosit.)

IMPORTANT !!

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit consilier, Maria BOGDAN

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerrespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENTIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecoconditionalitate prevazute in Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea conditiilor de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploataatiile agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesati: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.