



Registrul agricol
11-03-2020
JH

AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA



INTERNATIONAL YEAR OF
PLANT HEALTH

2020

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 9 din 10 . 03. 2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii :

COMPLEX DAUNATORI (PHYTODECTA F.; SUBCOCCINELLA-24 PUNCTATA; SITONA L) care poate cauza pierderi importante la cultura: **LUCERNA VECHĂ FURAJERĂ ȘI DE SAMANTA.**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului; **PHYTODECTA F.(gandacul roșu al lucernei)** Apariția are loc timpuriu în primăvară, când temperaturile medii zilnice sunt cuprinse între 8-9 C. Adultii și larvele atacă frunzele și lăstarii plantei. În primăvară adulții rod frunzele marginale sau le perforază. Larvele rod frunzele de la margini spre nervura principală, pe măsura ce ele se dezvoltă, distrug aproape total frunzele lăsând decât nervurile principale. În caz de apariții în masă sunt atacați și lăstarii, astfel în cât plantele se usușă.

SUBCOCCINELLA-24 PUNCTATA(buburuza lucernei). Insecta prezintă două generații pe an. Prima generație se dezvoltă în lunile mai- iunie, iar a doua în lunile iulie –august. Insecta atacă în stadiul de adult și larva distrugând epiderma și țesutul frunzei, de unde extrag suc. Frunzele rămân sub formă unor creste paralele și albicioase. În urma atacului, frunzele se rasucesc și se usușă.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **S-a depășit >30 % plante cu atac.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți produsul de mai jos, după caz:

1. FASTAC 10 EC - 0,15 l/ha.sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: **IMEDIAT DUPĂ PORNIREA ÎN VEGETAȚIE**

Alte recomandări:

Tratamentul se aplică în zile fără vânt și se va repeta în funcție de remanenta produselor și de condițiile nete.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Țițiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Țuați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu

Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10),neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica,precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

Suprafetele tratate se vo inscriptiona cu tablite de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor"(denumire produsului folosit.)

IN ATENTIA PRIMARIILOR !!! BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit, Maria BOGDAN